

BOALA	MOD DE TRANSMITERE	PERIOADA DE INCUBAȚIE	SIMPTOME ȘI EFECTE	TRATAMENT	MĂSURI PREVENTIVE
Infecții virale					
Gripă	prin aer	1-2 zile	febră, tuse, pierderea poftei de mâncare, durere de cap	odihnă, hrană lichidă	
Pojar	prin aer	10-14 zile	febră, lăcrimare, curgerea nasului, dureri de gât, puncte albe în gură, roșeața feței și a trunchiului	odihnă, hrană lichidă, antibiotice care să combată infecțiile bacteriene secundare	vaccinarea sau contractarea acestei boli în copilărie asigură imunitate pe viață
Varicelă	prin aer	10-20 zile	febră, apariția unor puncte roșii însoțite de mâncărime, apoi bășicuțe	odihnă, dietă adecvată, evitarea scărpinatului	contractarea bolii în copilărie asigură imunitate pe viață
Poliomielită	ajunge la gură de la fecale infestate	1-3 săptămâni	febră, durere de gât, iar în cazurile grave paralizii parțiale cauzate de infectarea celulelor nervoase	odihnă în pat și izolare	vaccinul oral asigură imunitate totală
Febra galbenă	înțepătura unei specii de țânțar	3-10 zile	febră, șubrezirea ficatului, icter, proasta funcționare a rinichilor	odihnă în pat; nu există tratament specific	vaccinul asigură imunitate timp de zece ani
Rabie (hidrofobia)	mușcătura unui câine infectat sau a altui animal	variază	spasme musculare, crize, delir, dificultăți în respirație, refuzul de a bea lichide	vaccinare imediată	carantină; omorârea animalelor infectate, administrarea vaccinului antirabic în zonele cu risc ridicat
Infecții bacteriene					
Tetanos	pătrundere într-o rană și eliberarea unei toxine	de la 2 zile la câteva săptămâni	febră, dureri, spasme ale mușchilor gâtului și maxilarului	sedare, administrarea unor substanțe pentru relaxarea mușchilor, antibiotice, anti-toxine	vaccinul conferă imunitate timp de 5 ani; injectarea de anti-toxine în cazul rănilor profunde
Febra tifoidă	apă și hrană contaminată	7-14 zile	febră, durere de cap, constipație sau diaree	antibiotice	prepararea și manipularea hranei în condiții igienice; vaccinul conferă imunitate limitată
Holera	apă contaminată cu fecale umane	1-7 zile	diaree cronică, deshidratare, distrugerea echilibrului hidric datorită pierderii de lichide și săruri	înlocuirea pierderilor de apă și săruri	igienă; vaccinul conferă imunitate limitată
Ciuma	șobolani, muște sau prin aer	2-10 zile	febră, umflarea ganglionilor limfatici, umflături ale pielii	antibiotice	controlul șobolanilor; vaccinul asigură imunitate limitată
Sifilisul	contact sexual	3-12 săptămâni (primul stadiu)	3 stadii: 1. Umflătură tare la locul infecției 2. Stare de boală, roșeață 3. După câțiva ani este afectat întregul organism	antibioticele sunt eficiente în primul stadiu, ultimele stadii necesită tratamente intensive cu antibiotice	evitarea contactelor sexuale cu purtători probabili; infectarea necesită tratament imediat, întreruperea relațiilor sexuale până la vindecare, înștiințarea relațiilor sexuale recente, pentru control medical și tratament
Gonoreea	contact sexual	aprox. 3 zile	Bărbați: durere la urinare și scăpări de urină	antibiotice	
Tuberculoza pulmonară	prin aer sau lapte de la vaci infestate	variază	o aparentă stare de sănătate, prelungită o perioadă lungă de timp, datorită izolării infecției în plămâni; uneori febră, tuse	odihnă, aer curat, dietă adecvată, medicamente specifice	vaccinul BCG reduce riscul îmbolnăvirii; pasteurizarea laptelui previne contractarea tuberculozei de la bovinele bolnave
Boala legionarilor	prin aer sau în condiții de umezeală	nu se știe	simptome asemănătoare gripei sau pneumoniei, însoțite de insuficiență renală	spitalizare, tratament cu antibiotice	controlul apei și a instalațiilor de aer condiționat